ANATOMIA II. Tema 3. Brote.

Analizando su nacimiento llegamos a la edad del paciente.

Los dientes aparecen en el reborde alveolar como engrosamiento del ectodermo, se crea una depresión hacia dentro (caperuza) con un esbozo del diente que estará a lingual del de leche.

Se forma en primer lugar la corona, a partir de ahí la raíz que hace emerger el diente definitivo provocando el desgaste de la raíz del diente de leche que así pierde la sujeción y se cae por los movimientos y fuerzas que sufre durante la masticación.

En la dentición temporal tenemos tres piezas en el grupo anterior y dos molares, el segundo molar tiene la misma forma que el molar definitivo pero es más pequeño.

En las siguientes tablas tenemos la edad aproximada de erupción de la piezas dentarias.



Dientes Temporales.

Como norma general aproximada de erupción: 7+4

Partimos de 7 por ser el mes en que aparece el primer diente temporal, el incisivo central inferior, y el 4 porque irán apareciendo los demás con plazos aproximados de cuatro meses hasta el mes 27 en que ya habrán aparecido las 20 piezas (que son 5 por cuadrante x 4 = 20). Hay que tener en cuenta que estos tiempos son aproximados y que pueden emerger antes o después.

Las piezas temporales son unos dientes que se tienen que caer pero que hay que mantener sanos porque tener problemas en ellos podría alterar la evolución de los definitivos.

Cronología del brote de los dientes temporales:

Orden de aparición.

	IC	IL	C	PM	SM
SUP.	2º	3º	7º	6º	10º
INF.	1º	4º	8º	5º	9º

Mes de aparición.

	IC	IL	C	PM	SM
SUP.	10	11	19	16	29
INF.	8	13	20	16	27

Cronología del brote de los dientes definitivos:

Año de aparición.

	IC	IL	C	PP	SP	PM	SM	TM
SUP.	7/8	8/9	11/12	10/11	10/12	6	12/13	18/25
INF.	6/7	7/8	9/10	12/13	11/12	6/7	11/13	18/25

Orden de aparición.

	IC	IL	C	PP	SP	PM	SM	TM
SUP.	4	6	10	8	9	1	13	
INF.	1	4	7	13	10	1	12	

Dentición y edad:

Dentición temporal.

La dentición de leche brota entre los siete y los veintisiete meses y es la dentición que existe hasta los seis años.

Dentición mixta.

Entre los seis y los 13 años, desde que sale el primer molar definitivo hasta que termina de salir el primer premolar inferior que es el último en salir antes de los cordales que saldrán o no.

Dentición definitiva.

Desde los 13 años en adelante.